

~ 靜脈注射 ~

★靜脈注射(點滴)

是將週邊靜脈導管暫時性的置放於靜脈中，進行輸液或給藥治療。

★併發症

靜脈炎、阻塞、液體滲漏等。

★照護注意事項

(一)維持點滴順暢：

1. 請勿自行調動點滴滴速，避免因滴數過快造成心肺不適；或太慢造成血液凝固堵住輸液管。
2. 下床活動時，請使用點滴架，讓點滴高於注射部位(約 90 公分以上)，並讓注射部位放低且放鬆，避免血液回流到輸液管造成阻塞不通。
3. 打上靜脈留置針時，針頭插入部位仍會有疼痛感，大約 10~20 分鐘後，疼痛會較減輕。
4. 點滴若是不慎滴空、輸液管路回血或是出現大量空氣等狀況，請通知護理人員。

(二)防止注射部位針頭移位或滑脫：

1. 點滴注射時若需更換衣服時，請通知護理人員給予協助。
2. 任何活動時，切記勿壓迫、扭曲或拉扯點滴管或固定處，勿碰撞注射部位，以避免造成滑脫。
3. 注射部位於關節處時，請勿彎曲該關節；靜脈留置針留置的手臂，勿用力提物。
4. 不要自行將固定點滴的膠帶撕除。

(三)預防感染：

1. 保持留置針處清潔乾燥減少發生感染機會；注射點滴期間可以用擦澡方式清潔身體，如淋濕可請護理人員協助。
2. 若注射部位周圍皮膚有發紅、蒼白、冰冷、腫脹、疼痛、點滴接頭鬆脫、滲血或漏水、點滴不順暢或不滴，血液逆流或膠布鬆脫及異常分泌物時，請立即通知護理人員處理，
3. 拔除靜脈留置針後，需注意注射部位傷口有無紅、腫、熱、痛、化膿或出血，若有以上情形，請立即通知護理人員處理，請勿自行冰敷或熱敷。

★打點滴時，出現呼吸困難、心跳加速等不舒服的情形時、任何關於點滴注射之問題請詢問護理人員。